

Суппозитории ректальные для детей до 1 года

Памятка для врача

Общая характеристика препарата

- МНН/действующие вещества: кокарбоксилазы гидрохлорид + рибофлавин + тиоктовая (липоевая) кислота.
- Код АТХ: A11JC — витамины в комбинации с другими препаратами.
- Фармако-терапевтическая группа: метаболическое средство; комбинированный препарат витаминов и коферментов.
- Лекарственная форма: суппозитории ректальные, торпедообразные, жёлтого цвета, с возможными вкраплениями оранжево-жёлтого цвета; вспомогательный компонент — жир твёрдый.

Особенность формы «НЕО»: пониженная по сравнению с препаратом Корилип дозировка действующих веществ в 1 суппозитории, что соответствует режиму дозирования у детей до 1 года.

Противопоказания и побочные эффекты

Противопоказания:

- реакция гиперчувствительности на компоненты, входящие в состав препарата;
- воспаление или кровотечение в прямой кишке (противопоказание, связанное с путём введения).

Побочные эффекты:

Возможны аллергические реакции — крапивница, зуд, бронхоспазм, диспептические явления. При появлении нежелательных реакций приём препарата следует прекратить и обратиться к врачу.

Лекарственное взаимодействие:

Отрицательного взаимодействия с другими препаратами не отмечено; может применяться в составе комплексной терапии.

Передозировка:

Случаи передозировки не описаны.

Состав и фармакологическое действие компонентов

Компонент (МНН)	Доза в 1 супп.	Фармакологическая роль
Кокарбоксилазы гидрохлорид	12,5 мг	Кофермент; катализирует карбоксилирование/декарбоксилирование α -кетокислот, участвует в углеводном обмене. Способствует коррекции метаболического ацидоза и клеточной гипоксии, а также нарушений функции печени, почек, ССС, хронических интоксикаций.
Рибофлавин (витамин В2)	1 мг	Кофермент флавинопротеинов; участвует в окислительно-восстановительных реакциях, углеводном, белковом и жировом обмене; вовлечён в синтез гемоглобина, поддержание функции слизистых и кожи.
Тиоктовая (липоевая) кислота	6 мг	Участвует в окислительном декарбоксилировании пировиноградной кислоты и α -кетокислот, регулирует липидный и углеводный обмен. Гепатопротекторное и антиоксидантное действие, улучшает дезинтоксикационную функцию печени.

Фармакокинетика: данные о фармакокинетике препарата Корилип-Нео производителем не предоставлены — этот факт следует учитывать при формировании клинических ожиданий и информировании родителей.

Особые указания и условия хранения

Критериями достаточности продолжительности терапии, наряду с клинической картиной, являются цитохимические показатели активности ферментов лейкоцитов периферической крови — сукцинатдегидрогеназы и глицерофосфатдегидрогеназы. Это может использоваться как объективный ориентир при принятии решения о продолжении/завершении курса. Хранить при температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте. Срок годности — 2 года; не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Отпускается по рецепту

Показания к применению

С профилактической и лечебной целью в составе комплексной терапии при патологических состояниях у детей до 1 года:

- хроническая тканевая гипоксия;
- снижение иммунитета;
- бактериальные и вирусные инфекции, в т.ч. острые кишечные инфекции;
- хронические соматические заболевания;
- хронические интоксикации;
- нарушения питания (гипотрофия) у детей.

Код МКБ-10	Показание
A04.9	Бактериальная кишечная инфекция неуточнённая
A49.9	Бактериальная инфекция неуточнённая
B34.9	Вирусная инфекция неуточнённая
D84.9	Иммунодефицит неуточнённый
E61.7	Недостаточность многих элементов питания
X49	Случайное отравление и воздействие другими и неуточнёнными химическими и ядовитыми веществами

Резюме для клинической практики

- У детей первого года жизни ректальная форма позволяет избежать инъекционной травматизации и трудностей, связанных с невозможностью перорального приёма таблеток, при сохранении курсового терапевтического воздействия.
- Неинвазивность формы и возможность введения родителями способствуют комплаентности при длительных повторных курсах терапии (3–4 курса по 10 дней с интервалом 20 дней).
- При срыгиваниях, диспепсии, сниженном аппетите — путь введения, не зависящий от состояния ЖКТ ребёнка.
- Оценку эффективности и решение о продолжительности терапии рекомендуется сопоставлять с цитохимическими показателями (СДГ, ГФДГ лейкоцитов) наряду с клинической динамикой.
- При достижении ребёнком возраста 1 года и необходимости продолжения терапии применяется препарат Корилип с соответствующим ему возрастным режимом дозирования.

Режим дозирования

Применяют ректально: суппозиторий, освобождённый от упаковки, вводят в задний проход после предварительного опорожнения кишечника.

Возрастная группа	Дозировка
Дети до 1 года	1 суппозиторий в сутки

Длительность курса лечения:

- 10 дней.

Общая продолжительность лечения:

- 3–4 курса с промежутком между курсами 20 дней (суммарно 3–4 месяца).

Корилип-Нео предназначен для применения у детей до 1 года; режим дозирования для более старших возрастных групп в инструкции по препарату Корилип-Нео не предусмотрен — при необходимости применения у детей старше 1 года используется препарат Корилип с соответствующим ему режимом дозирования.

Техника введения суппозитория

1. Вводить свечу следует после акта дефекации.
2. Свечу, хранившуюся в холодильнике, предварительно погреть в руках.
3. Ребёнка следует положить на левый бок, ноги согнуть в коленях и поджать к животу.
4. Ягодичную складку смазать средством для ухода с водоотталкивающим эффектом.
5. Достать свечу из упаковки и вращательным движением ввести её в анальное отверстие.
6. Подержать ягодичы сомкнутыми в течение нескольких минут.
7. Через 10–15 минут препарат всасывается и начинает оказывать действие.

Преимущества суппозиторной (ректальной) формы лекарственных средств

Ректальный путь введения в целом обеспечивает ряд клинически значимых характеристик, отличающих суппозиторную форму от парентеральной и пероральной форм доставки действующих веществ — что особенно актуально у детей до 1 года:

- Всасывание через слизистую прямой кишки происходит без контакта с кислой средой желудка и ферментами верхних отделов ЖКТ — фактор, значимый для веществ, чувствительных к разрушению при пероральном приёме.
- Отсутствие инвазивной процедуры устраняет риски, ассоциированные с парентеральным введением: постинъекционные инфильтраты, гематомы, флебиты, местные инфекционные осложнения при нарушении асептики.
- Введение не требует стерильных условий и участия медицинского персонала, что позволяет проводить курс лечения амбулаторно, силами родителей/опекунов.
- Путь введения не зависит от состояния аппетита, наличия срыгиваний, рвоты или диспептических явлений, что расширяет применимость при нарушениях питания и в период острых состояний у грудных детей.
- Отсутствие болевого и инвазивного компонента процедуры снижает стресс для ребёнка и облегчает соблюдение полной длительности курсовой терапии.

Данные закономерности характерны для суппозиторной формы в целом и применимы, в частности, к ректальным препаратам разных фармакологических групп. Конкретные показания, режим дозирования и противопоказания препарата определяются его собственной инструкцией по медицинскому применению; выше (разделы 1–6) они приведены для Корилипа-Нео.

Сравнение путей введения

Клинический аспект	Ректальные суппозитории	Пероральный приём (таблетки)	Парентеральное введение
Инвазивность / риск процедурных осложнений	Неинвазивно; отсутствует риск постинъекционных инфильтратов, гематом, флебитов, инфицирования в месте инъекции	Инвазивно: риск гематом, постинъекционных инфильтратов и абсцессов, флебитов, инфицирования при нарушении асептики	Неинвазивно, но затруднено у грудных детей
Контакт со слизистой верхних отделов ЖКТ	Отсутствует: действующие вещества не подвергаются воздействию желудочного сока и ферментов	Отсутствует	Присутствует: возможна инаktivация части дозы, локальное раздражение слизистой
Условия введения / участие медперсонала	Проводится родителями/опекунами в домашних условиях	Требует стерильных условий и участия обученного медработника	Ограничено у детей до 1 года из-за неспособности глотать таблетки
Применимость при срыгиваниях, рвоте, отказе от приёма внутрь	Сохраняется	Сохраняется	Ограничена или невозможна

Важно

Материал подготовлен на основе действующей инструкции по медицинскому применению препарата Корилип-Нео и носит информационно-справочный характер для специалистов здравоохранения. Разделы 7–9 содержат общее клинико-фармакологическое обоснование суппозиторной формы введения лекарственных средств и не являются инструкцией по медицинскому применению какого-либо конкретного препарата. Материал не заменяет инструкцию по медицинскому применению и клинические рекомендации и не должен использоваться пациентами/родителями для самостоятельного принятия решений о лечении. Полная информация — режим дозирования, противопоказания, меры предосторожности, взаимодействие с другими препаратами — приведена в действующей инструкции по медицинскому применению препарата Корилип-Нео: https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC

